

13 entre 40 et 50 ans - savoir
 1 de 40 ans
 3 de 41 ans
 2 de 42 ans
 1 de 43 ans
 1 de 44 ans
 2 de 45 ans
 3 de 46 ans
 Total 13 dont cinq du mal d'estomac

Deux poitrinaires, quatre infirmes, de la dysenterie, de la fièvre malarique

9 de 50 à 60 ans - savoir
 1 de 50 ans
 1 de 51
 1 de 52
 1 de 53
 2 de 54
 3 de 55
 1 de 56
 Total 9 dont 1 du sergent, 2 poitrinaires

3 paralytiques, 1 infirme, du dérèglement, 1 enflé et son, du mal d'estomac.

7 entre 60 et 70 ans - savoir
 2 de 60 ans
 1 de 64 ans
 4 de 69 ans
 Total 7 dont 2 morts subitement mais atteints du mal d'estomac, du mal d'estomac, de la fièvre et thénosue, du thénosue, d'une colique prompte, 1 enflé.

12 entre 70 et 80 ans - savoir
 2 de 72 ans
 3 de 73
 3 de 74
 3 de 75
 1 de 76
 1 de 77
 Total 12 dont 2 de la fièvre, 1 poitrinaire, 2 du dérèglement, 1 enflé, 1 d'un ulcère, deux de vieillesse

4 entre 80 et 90 ans - savoir
 1 de 80
 1 de 82
 1 de 84
 1 de 89
 Total 4 dont 1 d'un ulcère, 2 du dérèglement, 1 vieillesse

Remarques générales - Sur 87 morts 23 de la Diarrhée du thénosue ou de la dysenterie eugis et plus de quarante cette maladie a partiellement frappé les enfants et les vieillards. 16 du mal d'estomac eugis et plus de dixième. 10 de la poitrine 9 de la fièvre. 6 du sergent ou des suites 4 de l'infirmité 3 paralytiques 3 de coliques 2 d'accidents 2 morts subits 2 charbon 1 infirme 6 vieillesse 4 Une grande partie des Diarrhées des enfants ont eu pour cause première les vers. beaucoup ont eu des taches sur la peau

Remarques faites sur les naissances et les mortalités sur 1/4^{ème} Cilly depuis Juin 1810 jusqu'en Aôr 1818

Années	Naissances	Morts
1810	0	4
1811	7	8
1812	4	4
1813	13	7
1814	4	9
1815	15	9
1816	8	13
1817	7	15
1818	10 (2 de plus que l'année 1817 et un au monde mort)	28 (7 de plus que l'année 1817 et 21 au monde mort)
	68	87 Mort
		87 naissances
		19 Différence

Les pertes des années 1817 et 1818 sont aux pertes des années précédentes comme quatre est à un pour les années où il y avoit eu le moins de mortalités; et comme quatre est à deux pour les années où il y en avoit eu le plus; enfin comme trois deux tiers est à deux pour le terme moyen de toutes les années antérieures: Ainsi dans les mortalités de ces deux dernières années ont été près du double du terme moyen des mortalités de toutes les années précédentes.

Durant les années 1817 et 1818 sans cinq grandes habitations trois ont fait des pertes extraordinaires, deux n'ont perdu que dans des proportions modérées.

Naissances	Morts	Total des Morts
1819	5	10
		105
		73
		32

Observation faite sur les naissances des nègres sur l'Île de St. Pierre depuis
Juin 1810 jusqu'en octobre 1814.

- 87 grossesses déclarées
- 3 qui n'ont eu aucun suite
- 9 fausses couches
- 72 couches simples
- 3 couches doubles
- 78 naissances
- 46 garçons
- 34 filles

- 1 mort des fatigues de la couche
- 8 morts du mal de mâchoire
- 1 mort étouffé par accident sous sa mère lorsqu'elle dormait
- 10 des garçons morts dans les huit ans dont trois entre sept et
8 des filles } huit ans du mal d'estomac; deux entre un et
deux ans de révolution de vers; deux entre deux
et trois ans de la fièvre; et onze des suites
du divolement et de l'infirmité et ayant des taches
à la peau.

Tous ces enfants ont été cruellement atteints par les vers

Remarque, les morts du mal de mâchoire sont arrivées
durant les premières années. Je remarquai alors que ce mal
attaquait les enfants lorsqu'il y avait de grand vent froid, la
porte de la chambre des nègres en couche étoit à l'est. Je les ai alors
mis dans une chambre dont la porte est sous le vent à l'ouest, et depuis

ce moment il n'y a plus eu de mal de marche.

Les observations faites sur la mortalité des nègres de l'Hôpital Cely, et sur la nature des maladies, durant les huit dernières années, démontrent que les principales maladies des nègres de cette habitation sont les Diarrhées, de toute espèce, le mal d'estomac, le mal de poitrine et les fièvres.

Il convient de rechercher quelles peuvent être les causes de ces maladies, quels en sont les symptômes, et quels sont autant que possible les moyens de les prévenir. Il convient aussi d'avoir quelque connaissance des traitements de ces sortes de maladies afin d'être au plus pressé dans les cas urgents, ou l'on serait obligé d'attendre trop longtemps le médecin.

Il paraît que chez les enfants la Diarrhée est causée plus souvent par les vers que par toute autre cause; il faut donc soigner leur genre de nourriture. On croit avoir observé que trop de morue et de viande salée, trop de fruits crus, procure des vers; les farineux tout au contraire, les légumes et les fruits cuits n'ont point ce défaut, ainsi on ne peut composer la principale nourriture des enfants. Les symptômes des vers sont la prunelle dilatée, les yeux carrés, les remangeaisons du nez, l'aspersion des douleurs d'estomac et de ventre surtout au tour du nombril, la chaleur du ventre accompagnée d'un peu de fièvre, la Diarrhée qui dégénère quelquefois en dysenterie et en dysenterie enfin les convulsions. Quelques personnes croient ne devoir donner aux enfants de contre vers que lorsqu'ils souffrent de ces insuites. D'autres leur en donnent par précaution, elles choisissent pour cela le temps des renouvellement des saisons surtout les équinoxes et le retour de la lune. D'autres enfin pensent que si les enfants viennent à souffrir des vers durant la pleine lune il ne faut pas leur donner du contre vers parce que ces insectes sont alors trop vigoureux et s'attacheraient avec force aux intestins au point qu'ils continueraient à se multiplier. D'autres pensent qu'il faut donner aux enfants du sirop afin de nourrir le vers et l'empêcher de s'attacher aux intestins, avoir soin que les enfants ne soient jamais à jeun et attendre le prochain retour de la lune pour leur donner du contre vers.